

Tiburones: guía de campo

Todas las especies de la base de datos de Shark Data Lab,
con los rasgos que las distinguen



Muestra · Edición 2026 · 3 especies

Datos a 13 de septiembre de 2026

Foto de portada: Tiburón sarda · João D'Andretta · CC BY 4.0

Cómo usar esta guía

Esta guía cubre todas las especies de tiburón vivas de la base de datos de Shark Data Lab: las especies implicadas en incidentes registrados en el mundo, sus parientes cercanos y los tiburones que más a menudo encuentran buceadores, surfistas, pescadores y bañistas. Está escrita para quien está en el agua, no para taxónomos.

Las especies se agrupan por orden y familia, porque así es como los tiburones se parecen de verdad. Cuando un informe dice solo "tiburón martillo" o "wobbegong", hay que mirar el capítulo de la familia. Cada capítulo abre con una tabla comparativa de sus miembros.

Cada ficha da de 3 a 5 rasgos de identificación comprobables en un animal vivo, luego las especies con las que más se confunde y la diferencia que lo resuelve. Los rasgos salen de las descripciones publicadas de cada especie; un rasgo que las fuentes no respaldan se omite en vez de inventarse.

Los recuentos de incidentes proceden del Global Shark Attack File y se vinculan a las especies por nombre. Las identificaciones de los testigos suelen ser inciertas: léalos como incidentes registrados, no como totales de referencia. Los incidentes anotados solo a nivel de grupo ("un tiburón martillo") se muestran aparte y nunca se atribuyen a una especie.

Las tallas son longitudes máximas registradas. Las áreas son orientativas: el mapa resalta las cuencas oceánicas y los mares donde la especie se registra con regularidad. Las categorías de la Lista Roja de la UICN son las de la última evaluación al redactar la guía.

Fuentes: World Register of Marine Species (taxonomía y sinónimos), Lista Roja de la UICN vía GBIF (estado de conservación), Global Shark Attack File (incidentes), descripciones de especies publicadas y reseñas enciclopédicas (biología y rasgos). Las fotografías se reproducen bajo la licencia indicada en los créditos al final.

Este PDF es para uso personal del comprador. Por favor, no lo redistribuya. Preguntas y correcciones: hello@sharkdatalab.com.

Cornuda común

Sphyrna lewini

CR · En peligro crítico

1 registrados · 0 mortales

Reconocible por el borde frontal festoneado de su cefalofilo. Forma grandes cardúmenes diurnos de cientos de individuos, siendo uno de los pocos tiburones en hacerlo. Se encuentra En Peligro Crítico debido al comercio mundial de aletas y la captura incidental.



Foto: Kris-Mikael Krister · CC BY 2.0

DE UN VISTAZO

LONGITUD MÁX.	4.3m
DIETA	Peces óseos, tiburones, rayas e invertebrados.
REPRODUCCIÓN	Los tiburones martillo común tienen periodos de gestación...
CAMADA	14 to 26
DESCRITO	Griffith & Smith, 1834


IDENTIFICACIÓN

- 1 Cabeza en forma de martillo (cefalofilo) con tres indentaciones onduladas en su borde frontal — la muesca central es la característica clave.
- 2 Gris claro a bronce en el dorso, blanco en el vientre; aletas pectorales con puntas oscuras o negras y mancha oscura en el lóbulo inferior de la cola.
- 3 Primera aleta dorsal grande y ligeramente curvada; segunda aleta dorsal más pequeña.
- 4 Hasta 4,3 m; se observa con mayor frecuencia cerca de la costa, en bahías o sobre plataformas continentales, a menudo en grandes cardúmenes diurnos.

NO CONFUNDIR CON

- ≠ **Gran tiburón martillo** (*Sphyrna mokarran*) — El gran tiburón martillo tiene el borde frontal del cefalofilo casi recto, sin ondulaciones, y una primera aleta dorsal mucho más alta; alcanza mayor tamaño, hasta 6,1 m.
- ≠ **Cornuda cruz** (*Sphyrna zygaena*) — El borde frontal del cefalofilo del tiburón martillo liso es suavemente arqueado, sin indentación central ni ondulaciones; las puntas de las aletas pectorales son oscuras, no negras.
- ≠ **Carolina Hammerhead** (*Sphyrna gilberti*) — El tiburón martillo de Carolina es prácticamente idéntico en forma, pero tiene un menor número de vértebras y solo está confirmado en el Atlántico occidental; no se puede distinguir de forma fiable sin examinarlo.

DÓNDE VIVE



Los tiburones martillo común se distribuyen en todo el mundo en mares tropicales y templados cálidos. Son una especie migratoria, gregaria, costera-pelágica y semi-oceánica que se desplaza dentro d...

Hábitat. Estos tiburones prefieren las plataformas continentales e insulares adyacentes a aguas profundas. Pueden encontrarse desde...

LAS PERSONAS Y ESTE TIBURÓN

Capaz de causar lesiones dado su tamaño, pero es tímido y rara vez está implicado en incidentes. Los buceadores suelen encontrar a los tiburones martillo común en cardúmenes: son esquivos y difíciles de aproximar.

49 incidentes más dicen solo "tiburón martillo (especie no confirmada)" y no se atribuyen a ninguna especie.

INCIDENTES REGISTRADOS

1	0	1968
REGISTRADOS	MORTALES	AÑOS

Más registrados en Sudáfrica (1)

Tiburón sarda

Carcharhinus leucas

275 registrados · 57 mortales

Uno de los tiburones más peligrosos debido a su agresividad, comportamiento territorial y su singular capacidad de sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Es responsable de numerosos ataques en aguas costeras y fluviales turbias de todo el mundo.



Foto: João D'Andretta · CC BY 4.0

DE UN VISTAZO

LONGITUD MÁX.	3.4m
DIETA	El tiburón se alimenta principalmente de peces óseos, pero es un...
REPRODUCCIÓN	Vivíparo, con placenta de saco vitelino.
CAMADA	1 to 13
TALLA AL NACER	81cm
DESCRITO	Valenciennes, 1839


IDENTIFICACIÓN

- 1 Cuerpo muy robusto y macizo — más ancho y pesado que otros tiburones requiem de igual longitud.
- 2 Hocico corto, ancho y plano; sin cresta interdorsal.
- 3 Gris uniforme en el dorso, blanco en el vientre; sin marcas prominentes en las aletas en los adultos.
- 4 La segunda aleta dorsal es notablemente más pequeña que la primera.
- 5 Aguas costeras poco profundas y ríos — es el único tiburón grande que se encuentra con regularidad muy río arriba en agua dulce.

NO CONFUNDIR CON

- ≠ **Tiburón picudo** (*Carcharhinus amboinensis*) — El tiburón ojirredondo es casi idéntico en forma y color; sus rangos se superponen, pero raramente se lo encuentra en agua dulce y tiene ojos pequeños y circulares.
- ≠ **Tiburón oscuro** (*Carcharhinus obscurus*) — El tiburón oscuro tiene un color gris similar, pero posee una cresta interdorsal y un cuerpo más hidrodinámico y menos robusto que el tiburón toro.

DÓNDE VIVE



Aguas costeras poco profundas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Esta especie tiene la capacidad de penetrar en agua dulce; ha sido capturada a 3.691 km [2.294 millas] río arriba en el Amazonas e...

Hábitat. Generalmente se encuentra cerca de la costa en aguas de menos de 30 m [100 pies] de profundidad.

LAS PERSONAS Y ESTE TIBURÓN

Se trata de un tiburón grande y agresivo, con mandíbulas enormes, que se mueve como un guerrero experimentado. El Global Shark Attack File (GSAF) registra varios casos en los que el ascenso rápido de un buceador puede haber 'desencadenado' una respuesta agresiva (similar a cuando un intruso huye de un perro guardián). En cada caso, tras una única... 31 incidentes más dicen solo "tiburón requiem (especie no confirmada)" y no se atribuyen a ninguna especie.

INCIDENTES REGISTRADOS

275

REGISTRADOS

57

MORTALES

1880–

2026

AÑOS

Más registrados en Estados Unidos (88) · Australia (57) · Sudáfrica (20)

Spotted Wobbegong

Orectolobus maculatus

Ningún incidente registrado nombra esta especie.

Depredador emboscador con alto grado de camuflaje, propio de los arrecifes costeros de Australia. Utiliza elaborados pliegues cutáneos y un patrón moteado para mimetizarse con el fondo marino. Es responsable de un pequeño número de incidentes, casi siempre cuando alguien lo pisa accidentalmente.



Foto: Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey · CC BY 4.0

DE UN VISTAZO

LONGITUD MÁX.	1.25m
DIETA	Peces de fondo e invertebrados
REPRODUCCIÓN	Ovovivíparo
DESCRITO	Bonnaterre, 1788

IDENTIFICACIÓN

- 1 Cuerpo plano y ancho, cubierto de tonos verdes, amarillos o marrones con una red de líneas y manchas características en forma de O.
- 2 Cabeza orlada con lóbulos dérmicos y grandes barbillas que se extienden desde las fosas nasales; de seis a diez lóbulos alrededor de cada ojo.
- 3 Alcanza entre 150 y 180 cm, ocasionalmente más; grande y robusto en comparación con la mayoría de los otros wobbegongs.
- 4 Descansa inmóvil sobre arrecifes rocosos, praderas de algas marinas o fondos arenosos durante el día; activo de noche.
- 5 Endémico de las aguas australianas; se encuentra desde arrecifes costeros poco profundos hasta al menos 176 m de profundidad.

NO CONFUNDIR CON

- ≠ **Ornate Wobbegong** (*Orectolobus ornatus*) — El wobbegong ornamentado carece de las manchas características en forma de O; el wobbegong manchado tiene más lóbulos dérmicos y marcas blancas en el cuerpo.
- ≠ **Tasselled Wobbegong** (*Eucrossorhinus dasypogon*) — El wobbegong barbudo tiene una elaborada barba de borlas ramificadas alrededor de la cabeza; el wobbegong manchado tiene lóbulos dérmicos más simples y sin ramificaciones.
- ≠ **Banded Wobbegong** (*Orectolobus halei*) — El wobbegong bandeado carece de las manchas en forma de O y tiene menos lóbulos dérmicos; el wobbegong manchado también presenta marcas blancas distintivas ausentes en el wobbegong bandeado.

DÓNDE VIVE



Pacífico occidental, incluidas Nueva Guinea y el norte de Australia.

Hábitat. Arrecifes costeros tropicales y pozas de marea.

LAS PERSONAS Y ESTE TIBURÓN

Generalmente no agresivo a menos que sea provocado.

64 incidentes más dicen solo "wobbegong (especie no confirmada)" y no se atribuyen a ninguna especie.

INCIDENTES REGISTRADOS

0

REGISTRADOS

0

MORTALES

—

AÑOS

Conseguir la guía completa

Esta muestra incluye 3 fichas. La guía completa cubre todas las especies de tiburón vivas de la base de datos de Shark Data Lab, agrupadas por familia, con rasgos de identificación, especies parecidas, mapas de distribución e incidentes registrados de cada una.

www.sharkdatalab.com/es/guide

Créditos fotográficos

Las fotografías se reproducen bajo la licencia indicada; los derechos siguen siendo de sus autores. Los enlaces llevan al archivo original.

Cornuda común — Kris-Mikael Krister, CC BY 2.0 · commons: File:Scalloped_hammerhead_shark_(Sphyrna_lewini)_Costa_Rica_(cropped).jpg

Tiburón sarda — João D'Andretta, CC BY 4.0 · commons: File:Bull_shark_(Carcharhinus_leucas).jpg

Spotted Wobbegong — Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey, CC BY 4.0 · commons: File:Orectolobus_maculatus_cod_ground.jpg

Generado desde la base de datos de Shark Data Lab el 13 de septiembre de 2026. Texto © Shark Data Lab. Datos de especies compilados del World Register of Marine Species, la Lista Roja de la UICN, el Global Shark Attack File y descripciones publicadas.