

Requins : guide de terrain

Toutes les espèces de la base Shark Data Lab, avec les critères qui les distinguent



Extrait · Édition 2026 · 3 espèces

Données au 13 septembre 2026

Photo de couverture: Requin bouledogue · João D'Andretta · CC BY 4.0

Comment utiliser ce guide

Ce guide couvre toutes les espèces de requins vivantes de la base Shark Data Lab : les espèces impliquées dans les incidents recensés dans le monde, leurs proches parentes et les requins que rencontrent le plus souvent plongeurs, surfeurs, pêcheurs et nageurs. Il est écrit pour les gens qui sont dans l'eau, pas pour les taxonomistes.

Les espèces sont regroupées par ordre et par famille, parce que c'est ainsi que les requins se ressemblent réellement. Quand un rapport dit seulement « requin-marteau » ou « wobbegong », c'est au chapitre de la famille qu'il faut regarder. Chaque chapitre s'ouvre sur un tableau comparatif de ses membres.

Chaque fiche donne 3 à 5 critères d'identification vérifiables sur un animal vivant, puis les espèces avec lesquelles on la confond le plus souvent et la différence qui tranche. Les critères viennent des descriptions publiées de chaque espèce ; un critère que les sources n'appuient pas est laissé de côté plutôt qu'inventé.

Les comptes d'incidents viennent du Global Shark Attack File, rapprochés des espèces par leur nom. Les identifications des témoins sont souvent incertaines : lisez-les comme des incidents recensés, pas comme des totaux de référence. Les incidents notés seulement au niveau du groupe (« un requin-marteau ») sont indiqués à part et jamais attribués à une espèce.

Les tailles sont les longueurs maximales connues. Les aires sont indicatives : la carte met en évidence les bassins océaniques et les mers où l'espèce est régulièrement signalée. Les catégories de la Liste rouge de l'UICN sont celles de la dernière évaluation au moment de la rédaction.

Sources : World Register of Marine Species (taxonomie et synonymes), Liste rouge de l'UICN via GBIF (statut de conservation), Global Shark Attack File (incidents), descriptions d'espèces publiées et comptes rendus encyclopédiques (biologie et critères). Les photographies sont reproduites sous la licence indiquée dans les crédits en fin de guide.

Ce PDF est réservé à l'usage personnel de l'acheteur. Merci de ne pas le redistribuer.
Questions et corrections : hello@sharkdatalab.com.

Requin bouledogue

Carcharhinus leucas

275 recensés · 57 mortels

L'un des requins les plus dangereux en raison de son agressivité, de son comportement territorial et de sa capacité unique à survivre en eau salée et en eau douce. Responsable de nombreuses attaques dans les eaux côtières troubles et les rivières du monde entier.



EN BREF

LONGUEUR MAX.	3.4m
RÉGIME	Le requin se nourrit principalement de poissons osseux, mais...
REPRODUCTION	Vivipare, avec placenta vitellin
PORTÉE	1 to 13
TAILLE À LA NAISSANCE	81cm
DÉCRIT	Valenciennes, 1839


IDENTIFICATION

- 1 Très trapu, construction lourde — plus large et plus lourd que les autres requins carcharhinidés de même taille.
- 2 Museau court, large et plat ; pas de crête interdorsale.
- 3 Gris uni sur le dos, blanc sur le ventre ; pas de marquages aléatoires visibles chez les adultes.
- 4 Deuxième nageoire dorsale notablement plus petite que la première.
- 5 Eaux côtières peu profondes et rivières — le seul grand requin régulièrement rencontré loin en amont en eau douce.

À NE PAS CONFONDRE AVEC

- ≠ **Requin de Java** (*Carcharhinus amboinensis*) — Le requin aux yeux de pigeon a une forme et une couleur presque identiques ; leurs aires de répartition se chevauchent mais le requin aux yeux de pigeon se trouve rarement en eau douce et possède de petits yeux circulaires.
- ≠ **Requin sombre** (*Carcharhinus obscurus*) — Le requin obscur a une couleur grise similaire mais possède une crête interdorsale et un corps plus fuselé et moins trapu que le requin bouledogue.

OÙ IL VIT



Eaux côtières tropicales et subtropicales peu profondes du monde entier. Cette espèce a la capacité de pénétrer l'eau douce ; elle a été capturée à 2 294 milles [3 691 km] en amont du fleuve Amazone au...

Habitat. Généralement trouvé près des côtes dans des eaux de moins de 100 pieds [30 m] de profondeur.

L'HUMAIN ET CE REQUIN

C'est un grand requin agressif avec des mâchoires massives et il se déplace comme un guerrier aguerri. Le GSAF dispose de plusieurs cas dans lesquels l'ascension rapide d'un plongeur aurait pu « déclencher » une réaction agressive (similaire à quand un intrus fuit un chien de garde). Dans chaque cas, après une seule morsure à la jambe du plongeur (le requi... 31 autres incidents disent seulement « requin de la famille des Carcharhinidae (espèce non confirmée) » et ne sont attribués à aucune espèce.

INCIDENTS RECENSÉS

275	57	1880–2026
RECENSÉS	MORTELS	ANNÉES
Surtout recensés en États-Unis (88) · Australie (57) · Afrique du Sud (20)		

Requin-marteau halicorne

Sphyrna lewini

CR · En danger critique

1 recensés · 0 mortels

Reconnaissable par le bord festonné de son céphalofouille. Forme de grandes écoles diurnes de centaines d'individus — l'un des rares requins à le faire. En danger critique d'extinction en raison du commerce mondial des nageoires et des captures accessoires.



Photo: Kris-Mikael Krister · CC BY 2.0

EN BREF

LONGUEUR MAX.	4.3m
RÉGIME	Poissons osseux, requins, raies et invertébrés.
REPRODUCTION	Les requins-marteaux festonnés ont de longues périodes de...
PORTÉE	14 to 26
DÉCRIT	Griffith & Smith, 1834


IDENTIFICATION

- 1 Tête en forme de marteau (céphalotoile) avec trois indentations festonnées sur son bord antérieur — l'encoche centrale est la marque distinctive.
- 2 Gris clair à bronze sur le dessus, blanc sur le dessous ; nageoires pectorales à pointes sombres ou noires et tache sombre sur le lobe inférieur de la queue.
- 3 Grande première nageoire dorsale légèrement recourbée ; deuxième nageoire dorsale plus petite.
- 4 Jusqu'à 4,3 m ; généralement observée près des côtes, dans les baies ou au-dessus des plateaux continentaux, souvent en grands bancs diurnes.

À NE PAS CONFONDRE AVEC

- ≠ **Grand requin-marteau** (*Sphyrna mokarran*) — Le grand marteau a un bord antérieur de la céphalotoile presque droit sans festonnage, et une première nageoire dorsale beaucoup plus haute ; atteint une taille plus grande jusqu'à 6,1 m.
- ≠ **Requin-marteau commun** (*Sphyrna zygaena*) — Le marteau lisse a un bord antérieur de la céphalotoile en arche régulière sans indentation centrale ni festonnage ; les pointes des nageoires pectorales sont sombres, non à pointes noires.
- ≠ **Carolina Hammerhead** (*Sphyrna gilberti*) — Le marteau de Caroline est pratiquement identique en forme mais présente un nombre de vertèbres inférieur et n'est confirmé que dans l'Atlantique occidentale ; ne peut pas être séparé de manière fiable sans examen.

OÙ IL VIT



Les requins-marteaux festonnés se trouvent dans le monde entier dans les mers tropicales et tempérées chaudes. C'est une espèce migratrice, grégaire, côtière-pélagique et semi-océanique qui voyage...

Habitat. Ces requins préfèrent les plateaux continentaux et insulaires, adjacents aux eaux profondes. Ils peuvent être trouvés de la surface ...

L'HUMAIN ET CE REQUIN

Capable de causer des blessures compte tenu de sa taille, mais timide et rarement impliqué — les plongeurs trouvent généralement les requins-marteaux festonnés grégaires timides et difficiles à approcher.

49 autres incidents disent seulement « requin-marteau (espèce non confirmée) » et ne sont attribués à aucune espèce.

INCIDENTS RECENSÉS

1	0	1968
RECENSÉS	MORTELS	ANNÉES

Surtout recensés en Afrique du Sud (1)

Wobbegong tacheté

Orectolobus maculatus

Aucun incident recensé ne nomme cette espèce.

Prédateur embusqué hautement camouflé des récifs côtiers australiens. Utilise des replis cutanés élaborés et un motif tacheté pour se fondre dans le fond marin. Responsable d'un petit nombre d'incidents, presque toujours lorsqu'on marche dessus par inadvertance.



Photo: Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey · CC BY 4.0

EN BREF	
LONGUEUR MAX.	1.25m
RÉGIME	Poissons de fond et invertébrés
REPRODUCTION	Ovovivipare
DÉCRIT	Bonnaterre, 1788

IDENTIFICATION

- 1

Corps plat et large couvert de teintes vertes, jaunes ou brunes avec un réseau de lignes et des taches distinctives en forme de O.
- 2

Tête bordée de lobes dermiques et de grands barbillons s'étendant des narines ; six à dix lobes autour de chaque œil.
- 3

Atteint 150–180 cm, occasionnellement plus grand ; grand et robuste comparé à la plupart des autres wobbegongs.
- 4

Repose immobile sur les récifs rocheux, les prairies marines ou les fonds sableux pendant le jour ; actif la nuit.
- 5

Endémique aux eaux australiennes ; trouvé des récifs côtiers peu profonds à au moins 176 m de profondeur.

À NE PAS CONFONDRE AVEC

- ≠

Wobbegong orné (*Orectolobus ornatus*) — Le wobbegong orné manque les taches distinctives en forme de O ; le wobbegong tacheté a plus de lobes dermiques et de marques blanches sur son corps.
- ≠

Wobbegong barbu (*Eucrossorhinus dasypogon*) — Le wobbegong à tassels a une barbe élaborée de tassels ramifiés autour de la tête ; le wobbegong tacheté a des lobes dermiques plus simples et non ramifiés.
- ≠

Banded Wobbegong (*Orectolobus halei*) — Le wobbegong rayé manque les taches en forme de O et a moins de lobes dermiques ; le wobbegong tacheté a aussi des marques blanches distinctives absentes chez le wobbegong rayé.

OÙ IL VIT



Pacifique occidental, y compris la Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie.

Habitat. Récifs tropicaux côtiers et bassins de marée.

L'HUMAIN ET CE REQUIN

Généralement non agressif sauf s'il est provoqué. 64 autres incidents disent seulement « wobbegong (espèce non confirmée) » et ne sont attribués à aucune espèce.

INCIDENTS RECENSÉS

0	0	—
RECENSÉS	MORTELS	ANNÉES

Obtenir le guide complet

Cet extrait montre 3 fiches. Le guide complet couvre toutes les espèces de requins vivantes de la base Shark Data Lab, regroupées par famille, avec critères d'identification, sosies, cartes d'aire et incidents recensés pour chacune.

www.sharkdatalab.com/fr/guide

Crédits photo

Les photographies sont reproduites sous la licence indiquée ; les droits restent à leurs auteurs. Les liens pointent vers le fichier source.

Requin bouledogue — João D'Andretta, CC BY 4.0 · commons: File:Bull_shark_(Carcharhinus_leucas).jpg

Wobbegong tacheté — Rick Stuart-Smith / Reef Life Survey, CC BY 4.0 · commons: File:Orectolobus_maculatus_cod_ground.jpg

Généré depuis la base Shark Data Lab le 13 septembre 2026. Texte © Shark Data Lab. Données d'espèces compilées depuis le World Register of Marine Species, la Liste rouge de l'UICN, le Global Shark Attack File et les descriptions publiées.

Requin-marteau halicorne — Kris-Mikael Krister, CC BY 2.0 · commons: File:Scalloped_hammerhead_shark_(Sphyrna_lewini)_Costa_Rica_(cropped).jpg